WIKIPÉDIA


Eotriceratops

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

Az ***Eotriceratops*** (nevének jelentése 'korai *Triceratops* ') a ceratopsia dinoszauruszok egyik neme, amely a késő kréta korban élt. A fosszíliáit a Horseshoe Canyon-formáció legfelső, 67,6 millió éves részén találták meg. A koponyája a beszámoló szerint körülbelül 3 méter hosszú.[1] A teljes hosszát nagyjából 9 méterre becsülték.[2]

Az *Eotriceratops* leírását Hsziao-csun Vu, Donald B. Brinkman, David A. Eberth és Dennis R. Braman készítette el 2007-ben, a típusfaja az *E. xerinsularis*.[1]

Eotriceratops 	
Evolúciós időszak: késő kréta, 67,6 Ma	
PreЄ Є O S D C P T J K Pg N	




Az *Eotriceratops* rekonstrukciója

Természetvédelmi státusz	
Fosszilis	
Rendszertani besorolás	
Ország:	Állatok *(Animalia)*
Törzs:	Gerinchúrosok *(Chordata)*
Altörzs:	Gerincesek *(Vertebrata)*
Altörzság:	Állkapcsosok *(Gnathostomata)*
Főosztály:	Négylábúak *(Tetrapoda)*
Csoport:	Magzatburkosok *(Amniota)*
Osztály:	Hüllők *(Reptilia)*
Öregrend:	Dinoszauruszok *(Dinosauria)*
Rend:	Madármedencéjűek *(Ornithischia)*
Alrend:	*Cerapoda*
Csoport:	*Marginocephalia*
Alrendág:	*Ceratopsia*
Öregcsalád:	*Ceratopsoidea*
Család:	*Ceratopsidae*
Alcsalád:	*Chasmosaurinae*
Nem:	***Eotriceratops*** Wu, 2007

Tartalomjegyzék

Anatómia



Az *Eotriceratops* (zöld) és a *Triceratops* (kék) becsült mérete az emberhez viszonyítva

Az *Eotriceratops* egyetlen hiányos csontváz alapján ismert, melyre széttagolva találtak rá a Dry Island Buffalo Jump Tartományi Park területén, a kanadai Alberta déli részén. A csontváza egy részleges koponya, a nyakfodor részeivel, a szemek feletti két nagy és az orr feletti kis szarvval, melyek hasonlítanak a rokonságába tartozó *Triceratopséra*. Számos nyak- és hátcsigolya, valamint borda is előkerült. Mivel a példányra gyengén beágyazódott palában találtak rá, a csontok közül több is összetört.[1] Egyedi koponyacsontjai, például a szokatlanul hangsúlyos pofacsonti szarv és a rendkívüli módon

meghosszabbodott, lapos és vékony, a *Torosaurus utahensiséhez* hasonló epoccipitalok (a nyakfodrot szegélyező és gyakran annak éléről kiálló csontok) miatt eltér a többi chasmosaurina ceratopsiától. A premaxilla és az orrcsont kapcsolódási pontjánál levő függőleges nyúlvány az *Eotriceratops* legegyedibb tulajdonsága, ami nem látható a rokon nemeknél; bár egyes *Triceratops* példányok szintén rendelkeznek ehhez hasonló kinövéssel, az nem ér el ilyen magasságot.[1] A szemek feletti szarvak előrefelé hajlanak és körülbelül 80 centiméter hosszúak. A bal szem felett a szarv tövénél harapásnyomokat fedeztek fel.[1]

Fajok

- *E. xerinsularis* Wu, 2007 (típus)

Hivatkozások


A Wikifajok tartalmaz ***Eotriceratops*** témájú rendszertani információt.


A Wikimédia Commons tartalmaz ***Eotriceratops*** témájú kategóriát.

Fordítás

Ez a szócikk részben vagy egészben a *Eotriceratops* című angol Wikipédia-szócikk ezen változatának (https://en.wikipedia.org/wiki/Eotriceratops?oldid=473782777) fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.

Jegyzetek

1. Wu 2007
2. Holtz 2008

Források

- ↑ **Holtz 2008:** Holtz, Thomas R. Jr.. *Dinosaurs: The Most Complete, Up-to-Date Encyclopedia for Dinosaur Lovers of All Ages (http://www.geol.umd.edu/~tholtz/dinoappendix/DinoappendixSummer2008.pdf)* (PDF), Random House, 52, updated appendix. o. (2008). ISBN 0375824197. Hozzáférés ideje: 2012. április 13.
- ↑ **Wu 2007:** Wu, X-C., Brinkman, D.B., Eberth, D.A., and Braman, D.R. (2007). „A new ceratopsid dinosaur (Ornithischia) from the uppermost Horseshoe Canyon Formation (upper Maastrichtian), Alberta, Canada". *Canadian Journal of Earth Science* **44** (9), 1243–1265. o.